


注腸エックス線検査を受けられる方へ

様

医師 ()

月 日 時 分に診察券を持って

胃腸科外来に直接お越しください。



<検査前日> (日)

朝食	食パン（何もつけない）・お粥 ・素うどん コップ一杯（200ml）以上の水かお茶を飲む。
午前10時	コップ一杯（200ml）以上の水かお茶を飲む。
昼食	食パン（何もつけない）・お粥 ・素うどん コップ一杯（200ml）以上の水かお茶を飲む。
午後2時	コップ一杯（200ml）以上の水かお茶を飲む。
午後4時	コップ一杯（200ml）以上の水かお茶を飲む。
夕食	味噌汁のうわずみ ・ 具のないスープ コップ一杯（200ml）以上の水かお茶を飲む。
午後7時	コップ一杯（200ml）以上の水かお茶を飲む。
午後8時	①水薬（ラキソベロン）1本をコップ8分目の水で薄め、全量飲む。 ②粉薬（マグコロールP）1袋を水150mlに溶かして飲む。
午後10時	赤い錠剤2錠をコップ一杯（200ml）以上の水かお茶と飲む。

*前日から検査終了まで牛乳は飲まないでください。

*水の飲み方が少ないと下剤が効かないので、できるだけ多目にとってください。

〈検査当日〉 () 日)

***朝食は食べないで下さい。**


午前7時	①起きる時、坐薬（レシカルボン）を肛門から挿入してください。 ②コップ1杯（200ml）以上の水かお茶を飲む。 *心臓 血圧等の薬を飲んでいる方は、この時間に飲んでください。
------	---

糖尿病の薬 注射は 医師の指示に従ってください
前日 () 当日 ()

- *当日は朝から下痢をします。できるだけ排便をしてきてください。
- *下着（パンツ）1枚をご用意ください。

《検査後の注意》

- ・検査終了後、トイレに行って注入したバリウムと空気を排泄していただきます。もし その時排泄されなくても、数時間後には排泄されます。
- ・検査終了後、お腹が張ったり 痛みのある方は、右を下にして横になったり、腹ばいになったりして空気を出すようにしてください。
- ・検査の前にした腸の運動を止める注射のため、目がチラチラしたり、喉が渇いたりすることがありますが、まもなく治ります。
- ・帰宅後、何かございましたらご連絡ください。



佐久総合病院 胃腸科外来 Tel0267-82-3131

看護師サイン()