

そけいヘルニアの手術を受けられた方へ



病院では()の入院を次のように計画しています。
 入院中の分からない事や心配な事は、何でも相談してください。
 また、痛みがある時は我慢せずに教えてください。

	手術前(/)	当日(/)	術後1日目(/)
食事	母乳・ミルクは飲んでよいです 食事が出ます 	朝6時から飲んだり食べたり出来ません 手術後許可が出たら水分から開始となります その後問題がなければ食事開始となります	食事が出ます 
安静	制限はありません	手術後抱っこをしてもよいです(手術部位を圧迫しないように気をつけてください) オムツの当て方はいつも通りでよいです	
清潔	シャワーまたは入浴できます		体を拭いて着替えをします
処置	身長・体重を測ります	手術着に着替えます	
薬・点滴		手術室で点滴をします 手術後医師の指示で点滴を抜きます 痛みがある時には痛み止めを使います	
説明	病棟内の案内をします 入院について説明します 麻酔科医師の診察があります	主治医より手術経過について説明があります 薬剤師から薬(痛み止め)について説明があります	主治医の診察後退院になります 退院の説明があります
その他	風邪症状がある場合はお知らせください	手術後排尿がありましたらお知らせください	



佐久総合病院 小児科病棟(4階西)

佐久市臼田197 tel 0267-82-3131

2006、0428 更新

担当医師

担当看護師



退院後の生活について



★退院後の生活についてご説明します★

傷口・・・傷口の消毒は不要です。

手術後は傷が多少腫れたり、赤くなることがありますが心配ありません。

出血や膿が出るようでしたら、病院に連絡してください。

痛み・発熱・・・手術部位の軽い痛みや、軽い発熱は、お子さんが元気になっているようなら

心配はいりません。痛みが強い時は、処方された痛み止めを使用してください。

また高熱(38℃以上)、嘔吐が続くなどの症状があれば、病院に連絡してください。

入浴・・・シャワーはよいです。

入浴は次回の受診まで待ちましょう。

薬・・・飲み薬はありません。

活動・・・通学、通園は痛みがなければ行ってよいです。

激しい運動や高いところから飛び降りるなどの行動は、1週間ほど避けてください。

外来受診について・・・次の外来は

月 日 (火) 14時30分

結城先生の外来で診察を行います。

受付をせずに直接外科外来の窓口にお越しください。

