

レジメン名	アミバンタマブ+カルボプラチン+ペムトレキセド療法(80kg以上)	投与間隔	21日間隔
-------	-----------------------------------	------	-------

1コース目

投与薬	投与量	1日目	2日目	3日目	8日目	15日目
アブレピダント	内服	125mg	80mg	80mg		
アセトアミノフェン	内服	1000mg	1000mg		1000mg	1000mg
グラニセトロン	1mg	↓				
デキサメタゾン		16.5mg	9.9mg			
ペムトレキセド	500mg/m ²	↓				
カルボプラチン	5AUC	↓				
ボララミン	5mg	↓	↓		↓	↓
アミバンタマブ		350mg/Body	1400mg/Body		1750mg/Body	1750mg/Body

2コース目

投与薬	投与量	1日目	2日目	3日目
アブレピダント	内服	125mg	80mg	80mg
アセトアミノフェン	内服	1000mg		
グラニセトロン	1mg	↓		
デキサメタゾン	6.6mg	↓		
ペムトレキセド	500mg/m ²	↓		
カルボプラチン	5AUC	↓		
ボララミン	5mg	↓		
アミバンタマブ	1750mg/Body	↓		

3, 4コース目

投与薬	投与量	1日目	2日目	3日目
アブレピダント	内服	125mg	80mg	80mg
アセトアミノフェン	内服	1000mg		
グラニセトロン	1mg	↓		
デキサメタゾン	6.6mg	↓		
ペムトレキセド	500mg/m ²	↓		
カルボプラチン	5AUC	↓		
ボララミン	5mg	↓		
アミバンタマブ	2100mg/Body	↓		

5コース目以降

投与薬	投与量	1日目
デキサメタゾン	6.6mg	↓
ペムトレキセド	500mg/m ²	↓
ボララミン	5mg	↓
アミバンタマブ	2100mg/Body	↓

* 葉酸0.5mgを治療7日前から連日経口内服投与
 VB₁₂ 1mgを7日前から9週ごとに筋肉内投与