



QIプロジェクト2015 佐久総合病院 結果報告

当院では2011年10月より日本病院会主催『QI推進事業(QIプロジェクト)』へ参加をしております。

2015年は全国310施設が参加をし、各施設でQIプロジェクトより指定された指標29項目を分析、その結果を公開し、自院と他院を比較することで各施設の『医療の質』の改善へ繋げていくことを目的としています。

分科移転後の2014年～2015年の当院と全国QIプロジェクト参加病院の平均を比較しました。


※医療の質(QI:Quality Indicator)とは『根拠（エビデンス）に基づいた医療(Evidence-based Medicine:EBM)』がどのくらい行われているのかを客観的に評価する指標のことです。

佐久総合病院 医療の質(QI)委員会

- 患者満足度調査（外来・入院）
- 死亡退院患者率
- 退院後6週間以内の救急医療入院率
- 入院患者転倒・転落発生率
- 入院患者転倒・転落による損傷発生率
- 褥瘡発生率
- 紹介率
- 逆紹介率
- 救急車・ホットライン需要率
- 糖尿病患者の血糖コントロール
- 脳卒中患者における指標

患者満足度調査（外来・入院）結果

QIプロジェクト2015 佐久総合病院



【計算定義・計算方法】

分子:「この病院での診療に大変満足・大変満足または満足している」と回答した外来・入院患者数


分母:患者満足度調査に回答した外来・入院患者数

患者満足度にて、「受けた治療の結果」、「入院期間」、「安全な治療」に対する患者の満足度をみることは、医療の質を測るための、直接的な評価の指標となる重要な一つです。

一般-1-a 患者満足度（外来患者） 満足

分子：「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問に満足と回答した外来患者数
分母：患者満足度調査に回答した外来患者数

FY2015 - 佐久総合病院 / 全施設




QIプロジェクト2015 患者満足度参加251施設の比較です

[【▲Page Top】](#)

一般-1-b 患者満足度（外来患者） 満足またはやや満足

分子：「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問に満足またはやや満足と回答した外来患者数
分母：患者満足度調査に回答した外来患者数

FY2015 - 佐久総合病院 / 全施設




QIプロジェクト2015 患者満足度参加251施設の比較です

一般-2-a 患者満足度（入院患者） 満足

分子：「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問に満足と回答した入院患者数
分母：患者満足度調査に回答した入院患者数

FY2015 - 佐久総合病院 / 全施設




QIプロジェクト2015 患者満足度参加251施設の比較です

一般-2-b 患者満足度（入院患者） 満足またはやや満足

分子：「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問に満足またはやや満足と回答した入院患者数
分母：患者満足度調査に回答した入院患者数


FY2015 - 佐久総合病院 / 全施設



QIプロジェクト2015 患者満足度参加251施設の比較です

死亡退院患者率結果

QIプロジェクト2015 佐久総合病院




【計算定義・計算方法】
分子:死亡退院患者数(平均16件)
分母:退院患者数(平均294件)

この死亡退院患者率から直接医療の質を比較することは、医療施設の特徴（職員数、病床数、平均在院日数、地域の特性など）と、入院患者のプロフィール（年齢、性別、疾患の種類や重症度など）が異り、正確な比較ができないため適切ではありません。病院医療の質と安全への取り組みの成果を可視化し、そこへ死亡率を反映させることが必要となります。

当院の死亡率平均値は全国QI参加病院平均値より1.7%高い結果となりました。

退院後6週間以内の救急医療入院率結果

QIプロジェクト2015 佐久総合病院




【計算定義・計算方法】
分子:退院後6週間以内救急入院患者数(平均10件)
分母:退院患者数(平均287件)

患者の中には、退院後6週間以内に予定外の再入院をすることがあります。その背景として、初回入院時の治療が不十分であったこと、回復が不完全な状態で患者に早期退院を強いたこと、などの要因が考えられます。前回入院と同一疾病で再入院したかどうかは見えていません。再入院の因果関係を判断することは難しいため、この指標は特定の疾病についてではなく、病院全体の質を見ることとしています。

当院の2015年度退院後6週間以内の救急医療入院率の平均値は全国QI参加病院平均値より0.9%高い結果となりました。

入院患者転倒・転落発生率結果

QIプロジェクト2015 佐久総合病院



【計算定義・計算方法】

分子: 転倒・転落発生数(平均16件)


分母: 入院延べ患者数(平均7,442人)

入院中の患者の転倒やベッドからの転落は少なくありません。原因としては、入院という環境の変化によるものや疾患そのもの、治療・手術などによる身体的なものなどさまざまなものがあります。転倒・転落の指標には、「転倒・転落により患者に傷害が発生した損傷発生率」と、「傷害には至らなかった転倒・転落の発生率」の二つがあります。後者の患者の傷害に至らなかった事例を追跡・原因や要因の分析をすることで、傷害発生予防へつなげることができます。

当院2015年度転倒・転落発生率の平均値は全国QI参加病院平均値より0.6%低い結果となりました。

入院患者転倒・転落による損傷発生率結果

QIプロジェクト2015 佐久総合病院



【計算定義・計算方法】

分子: 損傷レベル2(平均6人)または4以上(平均0.17人)

分母: 入院延べ患者数(平均7,442人)

転倒転落による損傷のうち「レベル2以上」または「レベル4以上」の傷害の発生率となります。


レベル2以上の損傷とは『軽度で包帯・氷・創傷洗浄などが必要となった損傷』のことです。

レベル4以上の損傷とは『重度で手術・ギプス・牽引などが必要となった損傷』のことです。

損傷レベルについてはThe Joint Commissionの定義を使用しています。「転倒・転落により患者に傷害が発生した損傷発生率」と、「傷害には至らなかった転倒・転落の発生率」両方を追跡することで損傷発生予防の取り組みを効果的に行っているかどうかをみることができます。

当院2015年度転倒・転落による**レベル2以上**の損傷発生率の平均値は全国QI参加病院平均値より**0.1%高い結果となり、2014年度より0.3%低くなりました。**


QIプロジェクト2015 佐久総合病院



当院2015年度転倒・転落による**レベル4以上**の損傷発生率の平均値は全国QI参加病院平均値より**0.03%低く、2014年度より0.04%低い結果となりました。**

褥瘡発生率結果

QIプロジェクト2015 佐久総合病院



【計算定義・計算方法】

分子:院内新規d2以上褥瘡発生数(平均2.3件)

分母:入院延べ患者数(平均7,376人)


褥瘡は、看護ケアの質評価の重要な指標の1つとなっています。褥瘡は患者のQOL（生活の質）の低下をきたすとともに、感染を引き起こすなど治癒が長期に及ぶことにより、結果的に在院日数の長期化や医療費の増大にもつながります。その為、褥瘡予防対策は、提供する医療の重要な項目の1つにとらえられ、1998年からは診療報酬にも反映されています。分子は当該入院期間内

に褥瘡を院内にて新規発生した可能性のある患者に限定し、d 2以上の褥瘡の院内新規発生患者としてしています。また、深さ判定不能な褥瘡(DU)・深部組織損傷疑いも含めています。褥瘡の深さについては、日本褥瘡学会のDESIGN-R(2008年改訂版褥瘡経過評価用)とInternational NPUAP-EPUAP Pressure Ulcer Guidelinesを用いています。d 2以上の褥瘡とは、真皮までの損傷のことです。

当院2015年度褥瘡発生率の平均値は全国QI参加病院平均値より0.05%低い結果となりました。また2014年度より0.01%低い結果となりました。

紹介率

QIプロジェクト2015 佐久総合病院



【計算定義・計算方法】

分子:紹介初診患者数(平均205件)

分母:初診患者数(平均2,006件)

他の医療機関から紹介され、初めて当院を受診した患者の割合です。

地域の医療機関との連携の度合いを示す指標となっています。


高度な医療を提供する医療機関にだけ患者が集中することを避け、地域の医療連携を強化し、地域全体で切れ間のない医療の提供を行うことが望まれています。

当院の2015年度紹介率の平均値は全国QI参加病院平均値より43.5%低い結果となりました。

逆紹介率

QIプロジェクト2015 佐久総合病院

逆紹介率



【計算定義・計算方法】

分子:逆紹介患者数(平均304件)

分母:初診患者数(平均2,006件)

初めて当院を受診した患者に対し、他の医療機関へ紹介した患者の割合です。


地域の医療機関との連携の度合いを示す指標となっています。

高度な医療を提供する医療機関にだけ患者が集中することを避け、地域の医療連携を強化し、地域全体で切れ目のない医療の提供を行うことが望まれています。

当院の2015年度紹介率の平均値は全国QI参加病院平均値より47.3%低い結果となりました。

救急車・ホットラインの応需率

QIプロジェクト2015 佐久総合病院



【計算定義・計算方法】

分子:救急車で来院した患者数(平均73件)

分母:救急車受け入れ要請患者数(平均114件)

救急車受け入れ要請のうち、受け入れた患者の割合です。

救急医療の機能を測る指標となっています。


本指標の向上は、救命救急センターに関連する部署だけの努力では改善できません。救急診療を担当する医療者の人数、診療の効率化、入院を受け入れる病棟看護師や各診療科の協力など、さまざまな要素がかかわります。

当院の2015年度救急車・ホットラインの応需率の平均値は全国QI参加病院平均値より20.3%低い結果となりました。

[▲Page Top]

糖尿病患者の血糖コントロール(HbA1c 7.0%未満の割合)

QIプロジェクト2015 佐久総合病院



【計算定義・計算方法】

分子:HbA1c(NGSP)の最終値が7.0%未満の外来患者数(平均89人)

分母:血糖降下薬年間90日以上処方されている外来患者数(平均181人)


糖尿病の治療には運動療法、食事療法、薬物療法があります。運動療法や食事療法の実施を正確に把握するのは難しいため、薬物療法を受けている患者のうち、適切に血糖コントロールがなされているかをみることにしました。HbA1cは、過去2～3ヶ月間の血糖値のコントロール状態を示す指標です。糖尿病患者の血糖コントロールは、HbA1cが6.5%以下であれば「良好」とされ、7.0%以下であれば「可」とされます。糖尿病による合併症頻度はHbA1cの改善度に比例しており、合併症を予防するために、HbA1cを6.5%以下に維持することが推奨されています。したがってHbA1cが7.0%以下にコントロールされている患者の割合を調べることは、糖尿病診療の質を判断するにふさわしい指標であると考えられます。ただし、種々の事情により、すべての患者で厳格な血糖コントロールを求めることが正しいとは限らないことも忘れてはなりません。

当院の2015年度糖尿病患者の血糖コントロールの平均値は全国QI参加病院平均値より約3%低い結果となりました。

脳卒中患者における指標

1.脳卒中患者のうち第2病日までに抗血栓治療を受けた患者の割合

QIプロジェクト2015 佐久総合病院



【計算定義・計算方法】
分子:分母のうち第2病日までに抗血栓療法を施行された患者数(平均5人)
分母:脳梗塞または一過性脳虚血発作と診断された18歳以上の入院患者数(平均6人)

脳梗塞急性期における抗血栓療法として、発症48時間以内のアスピリン投与が確立された治療法となっています。

また、米国心臓協会（AHA）/米国脳卒中協会（ASA）急性期脳梗塞治療ガイドライン2013では、脳梗塞急性期における抗血小板療法として、アスピリンを脳梗塞発症から24～48時間以内に投与することを推奨しています。（クラスI，エビデンスレベルA）したがって、適応のある患者には第2病日までに抗血小板薬の投与が開始されていることが望まれます。


当院2015年度脳卒中患者のうち第2病日までに抗血栓療法を受けた患者率の平均値は全国QI参加病院平均値より28.6%高い結果となりました。

患者の状態により抗血小板療法を選択しない場合もあります。

[【▲Page Top】](#)

2.脳卒中患者の退院時抗血小板薬を処方した割合

QIプロジェクト2015 佐久総合病院



【計算定義・計算方法】
分子:分母のうち退院時に抗血小板薬を処方された患者数(平均4人)
分母:脳梗塞または一過性脳虚血発作と診断された18歳以上の入院患者数(平均7人)


※死亡患者・転院患者・退院時抗凝固薬が処方されている患者は除外

LDLコレステロールを低下させるほど、脳卒中の発症率・死亡率が下がるという研究報告があります。海外の臨床試験(SPARCL)では高用量のスタチン製剤による脳卒中の再発抑制が示され、動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012年版ではスタチンによる脳梗塞発症の予防を「推奨レベル1、エビデンスレベルA（最も良質なエビデンスがあると認めた、最高の推奨度レベル）」としています。

当院2015年度脳卒中患者の退院時抗血小板薬を処方した率の平均値は全国QI参加病院平均値より約36%高い結果となりました。

3.脳梗塞における入院後早期リハビリ実施症例の割合

QIプロジェクト2015 佐久総合病院



【計算定義・計算方法】

分子:分母のうち入院後早期に脳血管リハビリテーションが行われた患者数(平均4.3人)

分母:脳梗塞で入院した患者数(平均5.1人)

脳卒中患者では早期にリハビリテーションを開始することで、機能予後をよくなり、再発リスクの増加もみられず、ADLの退院時到達レベルを犠牲にせずに入院期間が短縮されることが分かっています。

わが国の脳卒中治療ガイドライン2009では、「廃用症候群を予防し、早期のADL向上と社会復帰を図るために、十分なリスク管理のもとにできるだけ発症後早期から積極的なリハビリテーションを行うことが強く勧められている（グレードA）」と書かれています。

したがって、適応のある患者には早期からリハビリテーションが開始されていることが望まれます。

当院2015年度脳梗塞における入院後早期リハビリ実施症例率の平均値は全国QI参加病院平均値より16.7%高い結果となりました。2014年度より更に早期にリハビリを開始できる体制が整備されています。