

## ヨード系造影検査の際のビグナイド系糖尿病薬休薬のお願い
























ビグアナイド系糖尿病薬を服用したまま、ヨード系造影剤を使った検査をすると、まれに乳酸アシドーシスという副作用を生じる可能性があります。

検査2日前からの休薬が必要となりますので、服用している方はお知らせ下さい。

### 《休薬期間》

<b>検査前の腎機能が正常な場合</b> ( 正常の目安 : eGFR $\geq$ 60mL/min/1.73m <sup>2</sup> 、血清Cr正常)	2日前から休止、翌日再開 (計3日休止) やむを得ない場合は、「当日から休止、3日後再開」も可とする
<b>検査前の腎機能が異常または不明の場合</b> ( 異常の目安 : eGFR<60mL/min/1.73m <sup>2</sup> 、血清Cr高値)	2日前から休止、3日後再開 (計5日休止)

### 《ビグアナイド系糖尿病薬の一覧》

成分	後発医薬品	商品名	写真	識別コード
塩酸 メト ホルミン		メルビン錠 250mg		白色~帯黄白色の割線入り フィルムコート錠 
		グリコラン錠 250mg		白色の割線入りフィルム コーティング錠 
		メトグルコ錠 250mg		白色~帯黄白色の割線入り フィルムコート錠 
	●	メデット錠 250mg		白色の割線入り フィルムコート錠 
	●	メトリオン錠 250		白色のフィルム コーティング錠 
	●	メトホルミン塩酸塩錠 250mg「トーフ」		白色の割線入りフィルム コーティング錠 
	●	メトホルミン塩酸塩錠 250mg「JG」		白色の割線入りフィルム コーティング錠 
	●	ネルビス錠 250mg		白色の割線入り フィルムコート錠 
配合 剤		メタクト配合錠 LD		白色のフィルムコート錠 
		メタクト配合錠 HD		帯黄白色のフィルムコート錠 
塩酸 ブ ホルミン	●	ジベトス錠 50mg		白色の割線入りフィルム コーティング錠 
	●	ジベトンS腸溶錠 50mg		白色のフィルム コート錠 